

PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISÉ ► III b

Accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période Circulaire n°2003-135 du 8.09.2003

ÉLÈVE CONCERNÉ	ANNÉE SCOLAIRE :
NOM : PRÉNOM : DATE DE NAISSANCE : ADRESSE DU LIEU DE VIE DE L'ÉLÈVE : ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE (tampon) : CLASSE :	

PARTIES PRENANTES

Coordonnées des responsables légaux

NOM – PRÉNOM	ADRESSE	TELEPHONE
Parent effectuant la demande de PAI :		Fixe Portable Mail
Parent :		Fixe Portable Mail
Autre responsable légal :		Fixe Portable Mail

Centre Médico-Scolaire de référence :

RÉFÉRENTS À CONTACTER EN CAS D'URGENCE

- Parents ou responsables légaux :
- Centre 15 / 112
- Médecin ou service hospitalier :
- Autre :

ÉLÈVE Nom - Prénom :

PROTOCOLE D'URGENCE EN CAS DE CRISE OU MALAISE AIGU

LOCALISATION DE LA TROUSSE D'URGENCE (spécifier clairement un ou plusieurs emplacements)

A préciser :

Elle doit être accessible à tout moment et à toute personne en charge d'administrer le traitement d'urgence.
La famille fournit les traitements nécessaires et remplace les médicaments périmés.

COMPOSITION DE LA TROUSSE D'URGENCE (fournie par les parents)

- Kit de Glucagen avec ordonnance jointe du diabétologue référent (peut être conservée de préférence au réfrigérateur ou à température ambiante n'excédant pas 25° pendant 18 mois. Lors des sorties scolaires en période chaude, elle devra être mise dans un sac isotherme)
- Stylo à insuline rapide et lente avec aiguilles (en cas de pompe défectueuse). *Doit être gardé au frais.*
- Set de changement de cathéter de pompe
- Resucrage adapté à l'enfant (fourni par les parents)
- Lecteur de cétonémie plus bandelettes urinaires de cétonurie
- **Copie du PAI**

L'élève doit toujours avoir dans ses affaires :

- Matériel nécessaire pour ses contrôles glycémiques obligatoires avant chaque repas et à chaque fois qu'il ne se sent pas bien.
- Resucrage adapté à son protocole

CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE A L'ECOLE

SIGNES D'APPEL possibles

CONDUITE A TENIR

- Quand l'enfant présente :

- Soif
- Besoin fréquent d'uriner
- Douleur abdominale
- Nausées, vomissements
- Odeur « pomme reinette » de l'haleine

- Il est en HYPERGLYCEMIE (> 300 mg/dl):
 - Permettre à l'enfant de boire (seulement de l'eau) et d'aller aux toilettes, accompagné.
 - Avertir les parents et/ou l'hôpital

CHU Saint Etienne 04-77-82-80-26
 CHR Roanne 04-77-44-34-23

- Si le cathéter est arraché : en reposer un dans l'heure qui suit.

Quand l'enfant présente :

- Pâleur
- Sueur
- Tremblements
- Fatigue, malaise, somnolence
- Sensation de faim
- Irritabilité, agitation, agressivité

- **L'enfant doit se reposer et doser sa glycémie si possible.**

- **Si la glycémie est ≤ 80 mg/dl (HYPOGLYCEMIE)**

Enfant conscient : doit manger même pendant un cours ++

- Jus de fruit. (à préciser).....cl.
ou sucre. Nombre de morceaux.....
- Plus biscuits (si repas à venir dans plus d'1h)

Enfant inconscient :

- Allonger l'enfant sur le côté
- Ne pas lui donner ni à boire ni à manger
- **Appeler le Centre 15 et/ou la famille pour faire une injection de GLUCAGEN** (seul le personnel de santé ou la famille sont habilités)

Et déconnecter la pompe à insuline du cathéter. Si on ne parvient pas à déconnecter le cathéter on peut le couper. (peut être fait par n'importe qui).

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

LES REPAS

- Ils sont pris au restaurant scolaire OUI NON

L'élève compose seul ses repas OUI NON

- Le repas doit se composer de : crudités, légumes à volonté, viande ou poisson, fruit ou dessert.

plus féculents cuits :gramme et pain.....gramme.

ACTIVITÉS PHYSIQUES

- Avertir le professeur +++

- Si l'élève ne se sent pas bien il doit pouvoir se reposer + faire un dextro et prendre une collation si besoin.

- L'élève peut enlever sa pompe jusqu'à 2 h consécutives pendant un activité physique.

- Piscine : débrancher la pompe

Dans le premier degré :

Présence des parents OUI NON

Dextro avant la piscine OUI NON

SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES

- Emporter la **trousse d'urgence** qui doit être vérifiée avant le départ, avec le **PAI**.

- L'élève doit toujours avoir sur lui son lecteur de glycémie et des collations.

- Discuter des activités et des repas, pris sur place, avec la famille

- En l'absence des parents :

- Fournir l'ordonnance correspondant au traitement
- Préciser les limitations d'activités
- Garder l'insuline sur soi afin de pouvoir respecter les horaires d'injections

ÉLÈVE Nom - Prénom :

Signataires (nom et signature obligatoire)

Date :

Nom du médecin qui a complété le PAI :
(tampon et signature)

Parents ou responsables légaux

Directeur d'école ou chef d'établissement

Inspecteur EN

Enseignant principal

Représentant de la collectivité
(restauration, périscolaire)

Autres intervenants (AVS.....)